

慈濟科技大學113學年各醫療院所實習體檢相關規定

縣市	實習院所	體檢報告	B型肝炎抗原	B型肝炎抗體	水痘抗體	麻疹抗體	德國麻疹抗體	腮腺炎	C肝抗體報告	A肝抗體報告	胸部X光	其他規定
花蓮市	花蓮慈濟醫院	◎	◎	◎	◎						一年內	B型肝炎抗體為陰性則需檢附施打第一劑疫苗注射證明，而曾完成三劑疫苗注射，但二個月後未產生抗體者，須追加一劑之證明。實習達3個月以上檢附MMR接種證明或抗體報告。
台中市	台中慈濟醫院	◎	◎	◎	◎	◎					一年內	B型肝炎抗體為陰性則需檢附施打第一劑疫苗注射證明，而曾完成三劑疫苗注射，但二個月後未產生抗體者，須追加一劑之證明。
新北市	台北慈濟醫院	◎	◎	◎	◎	◎	◎				一年內	一年內之B型肝炎、胸部X光攝影檢查報告結果及水痘與麻疹抗體檢驗報告(若水痘與麻疹抗體檢驗報告結果為陰性則需同步提供MMR及水痘施打證明，若為陽性則提供檢驗報告即可) COVID-19疫苗施打紀錄證明
嘉義縣	大林慈濟醫院	◎	◎	◎	◎	◎	◎				一年內	
花蓮市	衛生福利部花蓮醫院		◎								一年內	
花蓮縣	國軍花蓮總醫院	◎	◎	◎							一年內	
花蓮市	門諾醫院	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎		一年內	不具抗體者，需檢附疫苗注射完成證明。
花蓮縣	門諾壽豐分院		◎									
台北市	臺安醫院	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			3個月	不具抗體者需檢具B型肝炎疫苗注射完成證明或已具B型肝炎抗體檢驗證明。
台東市	台東基督教醫院		◎	◎		◎	◎			◎	一年內	抗體檢測效價不足者應接受疫苗施打，並檢附疫苗施打證明，未依規定完成者，本院有權暫停該生(見)實習課程，護理產兒科實習學生需加驗麻疹抗體及德國麻疹抗體。
宜蘭縣	羅東博愛醫院		◎	◎								不具抗體者需檢具B型肝炎疫苗注射完成證明或已具B型肝炎抗體檢驗證明。
彰化市	彰化基督教醫院	◎	◎	◎	◎	◎					一年內	抗體檢測效價不足者應接受疫苗施打，並檢附疫苗施打證明，未依規定完成者，本院有權暫停該生(見)實習課程。 COVID-19疫苗施打紀錄證明
台東市	台東馬偕紀念醫院	◎	◎	◎		◎	◎				一年內	不具抗體者需檢具B型肝炎疫苗注射完成證明或已具B型肝炎抗體檢驗證明， 至婦兒實習需施打Tdap(減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗)體檢報告的抗體皆須為三個月內的證明
花蓮縣	衛生福利部東區老人之家		◎								一年內	
台中市	臺中榮民總醫院	◎	◎	◎							三個月內	不具抗體者需檢具B型肝炎疫苗注射完成證明或已具B型肝炎抗體檢驗證明。

縣市	實習院所	體檢報告	B型肝炎抗原	B型肝炎抗體	水痘抗體	麻疹抗體	德國麻疹抗體	腮腺炎	C肝抗體報告	A肝抗體報告	胸部X光	其他規定
新北市	汐止國泰綜合醫院	◎	◎	◎							3個月內	實習3個月以上(含)，另應提供一年內麻疹及德國麻疹IgG抗體檢驗，為陰性者建議施打MMR疫苗並另附證明
彰化市	秀傳紀念醫院	◎	◎	◎	◎	◎					一年內	或五年內麻疹、水痘施打紀錄
台北市	臺北榮民總醫院		◎	◎							三個月內	不具抗體者需檢具B型肝炎疫苗注射完成證明或已具B型肝炎抗體檢驗證明。
花蓮縣	衛生福利部玉里醫院	◎	◎	◎							一年內	
台北市	三總醫院	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎		一年內	不具抗體者，需檢附疫苗注射完成證明。
苗栗縣	大千綜合醫院	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎		一年內	不具抗體者，需檢附疫苗注射完成證明。
宜蘭縣	陽明交大	◎	◎	◎	◎	◎	◎				一年內	不具抗體者，需檢附疫苗注射完成證明。